



Kooste vuoden 2014 pentuepalautteista

27.2.2016

- jalostustoimikunta
- kuvat Eila Pöysä

Yleistä

Pentuepalautteiden avulla kerätään tietoa shetlanninlammaskoirien lisääntymisterveydestä. Tietoa käytetään mm. rodun jalostuksen tavoiteohjelman päivittämiseen.



Vuonna 2014 palautteita on annettu
50 kpl 37:lta kasvattajalta.
Koosteessa on mukana 197 pentua.
Pentuekoko on 3,9 pentua.

Koiranetin mukaan vuonna 2014 rekisteröitiin tässä rodussa 289 pentuetta, joissa oli yhteensä 1026 pentua 180:ltä kasvattajalta. Pentueissa on **3,6 pentua**.

Juoksut

Keskimääräinen juoksujen väli oli 7kk. 46:n nartun juoksut olivat säännölliset, neljän epäsäännölliset,

yhdellä oli ollut kesken jäävä juoksu ja neljällä väritön juoksu.

Astutukset

Vastaajien koiria oli astutettu yhteensä 73 kertaa. Suurin osa astutuksista, 18 kpl (25%) ajoittui 13. vrk:lle juoksun alkamisesta, 15 kpl (20%) 12. vrk:lle ja 14 kpl (19%) 14. vrk:lle. Astutuspäivät ajoittuivat välille 7-18 vuorokautta.

Yhtä vastaajaa lukuun ottamatta kaikki ilmoittivat astutuksen sujuneen luonnollisesti. Yhden

nartun kohdalla oli käytetty keinosiemennystä.

Luonnollisista astutuksista seitsemässä astutuksessa nuorta urosta autettiin ”ohjaamalla oikeaan paikkaan”, pitämällä urosta paikoillaan kunnes koirat olivat jääneet kiinni sekä asettamalla koroketta narttua pienempikokoiselle urokselle. Myös narttua oli pidetty kevyesti kiinni.

Urosta oli jouduttu vaihtamaan viidelle nartulle. Kasvattajien ilmoituksen mukaan, astutus ei ollut

onnistunut kovasta yrityksestä huolimatta (näissä kokemattomat, nuoret urokset). Kahdessa astutustilanteessa uros oli todettu haluttomaksi ja yhdessä astutuksessa uros oli yrittänyt astua, mutta ”astutusta ei vaan saatu vietyä loppuun”.

Synnytys

Nartut synnyttivät keskimäärin 62:na vrk:na ensimmäisestä astutuksesta.

Pentueista 33 syntyi luonnollisesti, 12 pentuetta syntyi joko kasvattajan (9 kertaa) tai eläinlääkäriin (3 kertaa) avustamana. Viisi pentuetta syntyi keisarinleikkauksella.

Yhteensä 26 pentua syntyi kuolleena, neljä pentua kuoli syntymän jälkeen ja kahdeksan elävänä syntynyttä pentua piti lopettaa.

Kuolleina syntyneiden pentujen kuolinsyytä ei osattu sanoa. Synnytyksen jälkeen kuolleista pennuista varmaa kuolinsyytä ei ollut tiedossa yhdelläkään. Pentujen oireet liittyivät hengittämiseen tai

siihen, ettei niiden paino noussut. Pennut olivat päällisin puolin kunnossa olevan näköisiä, mutta niiden voimat syömiseen ehtyivät.

Myöhemmin lopetettujen pentujen ongelmina olivat kitalakihalkio (1 pentu), PDA (2 pentua) ja kahden pennun kohdalla syyksi ilmoitettiin alikehittyneisyys.

Pentujen keskimääräinen syntymäpaino oli 203g.



Imetys ja hoivakäyttäytyminen

Nartuista 43 imetti ja hoiti pentunsa itsenäisesti ilman apua, seitsemän nartun tarvitessa apua synnytyksen jälkeisessä pentujen hoidossa. Yksi narttu ei ollut halukas hoitamaan pentujaan.

Pienintä / pienimpiä pentuja lisäruokittiin ja huolehdittiin siitä, että ne pääsevät syömään nisälle eivätkä jääneet suurempien jalkoihin ensimmäisinä päivinä.

Emät imettivät pentujaan keskimäärin kuuden viikon ajan. Imetysaika vaihteli neljästä viikosta luovutusikään asti.

Pennuissa ilmeni

- 49/50 pentuetta silmätarkastettiin
- 21 pentueessa ei ollut mitään huomautettavaa
- 2:lla pennulla alapurenta
- 3:ssa pentueessa napatyrä 4:llä pennulla
- Kivekset eivät laskeutuneet 7:ssä pentueessa 10:llä pennulla
- Takakannukset 16:lla pennulla, 9:ssä pentueessa
- Häntämutka 1:llä pennulla
- Vesipää 1:llä pennulla
- Kallon aukile 1:llä pennulla
- Kitalaki- tai huulihalkio 1:llä pennulla

- Sydämen toiminnassa huomautettavaa 7:llä pennulla; 2 näistä PDA.

Kiitos palautteista!

