

Kinnerkyselyn kooste – Shetlanninlammaskoirat ry

29.9.2025




Uusi kinnerkysely julkaistiin joulukuussa 2022, ja siihen on lähes kolmessa vuodessa saatu 35 vastausta. Kiitos kaikille vastanneille!

Kyselyyn vastanneista uroksia oli 12 kappaletta (34,3 %), ja narttuja 23 (65,7 %).

Tyypillisimmin kinnervika ilmeni vähintään 1-vuotiailla, mutta alle 2-vuotiailla shelteillä (11 koiraa, 31,4 %). Seuraavaksi eniten kinnervikaa ilmeni alle 1-vuotiailla (9 koiraa, 25,7 %). 2–3-vuotiaita raportoitiin neljä kappaletta (11,4 %), 3–4-vuotiaita viisi kappaletta (14,3 %, yksi vastaus piti yhdistää tähän kategoriaan, ohut vaaleanvihreä setkori ympyrässä), 4–5-vuotiaita yksi kappale (2,9 %), 5–6-vuotiaita yksi kappale (2,9 %) ja 6 vuotta tai yli neljä kappaletta (11,4 %).

Minkä ikäisenä kinnervaiva ilmeni?

35 responses




Kaavio 1. Minkä ikäisenä kinnervaiva ilmeni?

Kinnervian esiintyminen ja harrastukset

Kinner alkoi vaivata useimmiten tapaturma-tyyppisesti koiran juostessa tms. (23 koira, 65,7 %), ja loppuilla ilmoitettiin, että varsinaista tapahtumaa ei huomattu, vaan koira alkoi vain ontua (12 koira, 34,3 %).

Minkälaisessa tilanteessa kinner alkoi vaivata?

35 responses



Kaavio 2. Minkälaisessa tilanteessa kinner alkoi vaivata?


Tapaturma-tyyppisesti kinnervaivan alkaneista 14 (60,1 %) on ilmoitettu harrastaviksi koiriksi (lajeina ilmoitettu mm. rally-toko, toko, agility, näyttelyt, nosework, hoopers), ja loppujen on ilmoitettu olevan kotikoiria ja käyvän vain normaaleilla lenkeillä (39,9 %).

Kinnervaivaisista, joilla kinner alkoi vaivaamaan niin, ettei varsinaista tapahtumaa huomattu, 8 koira (66,7 %) on ilmoitettu harrastaviksi koiriksi (lajeina ilmoitettu mm. agility, rally-toko, toko, näyttelyt, koiratanssi), ja loppujen on ilmoitettu olevan kotikoiria ja käyvän vain normaaleilla lenkeillä.

Kaikista vastanneista normaalia lenkkeilyä harrastettiin 25 kanssa (71,4 %), agilitya ja rally-tokoa molempia 12 kanssa (molemmat 34,4 %), näyttelyitä 11 kanssa (31,4 %), tokoa neljän kanssa (11,4 %), koiratanssia ja hoopersia kahden kanssa (molemmat 5,7 %) ja noseworkia yhden kanssa (2,9 %).

Mitä koiran kanssa on harrastettu ja harrastetaan?

35 responses



Kaavio 3. Mitä koiran kanssa on harrastettu ja harrastetaan


Kyselyssä myös kysytään, onko koiran kanssa voinut jatkaa samoja harrastuksia kinnervian toipumisajan jälkeen. Kahdeksan (22,9 %) ei vastannut tämän kyselyn osioon mitään, 21 vastasi kyllä (60,0 %), tosin pieni osa näistä vastaajista on harrastanut vain normaalia lenkkeilyä koiransa kanssa, ja 6 vastasi, että samaa harrastusta ei ole voitu jatkaa (17,1 %). Mainittuja harrastuksia, joita ei voitu enää jatkaa, oli rally-toko, näyttelyt ja agility, sekä normaali lenkkeily.

Kinnervian hoito

Kaikissa tapauksissa (100 %) kinnervian on diagnosoanut eläinlääkäri. Leikkaushoitoon (kirurgisesti) päädyttiin 18 koiran kohdalla (60,0 %). Konservatiiviseen hoitoon (lepo) päädyttiin 13 koiran kohdalla (37,1 %). Yhden koiran kohdalla käytettiin sekä konservatiivista että leikkaushoitoa (2,9 %).

Onko koiran kinner/kintereitä hoidettu eläinlääkärissä? Miten? Valitse kaikki koiraan koskevat vaihtoehdot.

35 responses




Kaavio 4. Onko koiran kinnertä/kintereitä hoidettu eläinlääkärissä? Miten?

Kinnervian esiintyminen uudelleen

Kenenkään vastatun koiran kohdalla samaa kinnertä ei ole tarvinnut leikata uudelleen. Kolmen koiran kohdalla kinner on jatkanut leikkauksenkin jälkeen oireilua esimerkiksi jalan pomputtelulla (8,6 %). Koirilla, joilla oireilu jatkui, kahdella oireilu jatkui alle 2 kuukauden päästä ensimmäisestä diagnoosista, ja yhdellä yli 6 kuukauden, mutta alle 1 vuoden jälkeen ensimmäisestä diagnosoinnista.

Uudestaan kinnervialle tyypillistä oireilua esim. jalan pomputtelua


3 responses



Kaavio 5. Uudestaan kinnervialle tyypillistä jalan pomputtelua

Kuudella koiralla (17,1 %) on myös toisen jalan kinner vaivannut. Lopuilla kinnervika on esiintynyt vain yhdessä jalassa (82,9 %). Koirilla, joilla myös toisen jalan kinner alkoi vaivaamaan, kenelläkään vaiva ei alkanut ensimmäisen jalan toipumisaikana, vaan myöhemmin. Toisen jalan kinnervian diagnosoivat jokaisen kuuden kohdalla eläinlääkäri, ja viidellä myös toinen jalka operoitiin kirurgisesti (leikkaushoito). Yhdellä toisen jalan kinner hoidettiin konservatiivisesti (lepo).


Onko samaa kinnertä jouduttu leikkaamaan uudestaan / Onko se vaivannut useammin kuin kerran?
34 responses



Kaavio 6. Leikatun kintereen uusintaleikkaus tai jatkuneet oireet

Toisen jalan hoito. Valitse kaikki koiraan koskevat vaihtoehdot.

6 responses



Kaavio 7. Toisen jalan hoito